

院内製剤の分類

2025/3/29

剤形 38		クラス I 17	クラス II 10	クラス III 11
内用剤 2	カプセル 0			
	散剤 2	ピルビン酸ナトリウム散 ビオチン原末		
	液剤 0			
外用剤 31	散剤 0			
	軟膏剤 6	Mohs' paste カプサイシン軟膏 (0.025, 0.05%) ヒドロキノン軟膏10% メトニダゾールクリーム1%		ポビドンヨード・ソルトゲル (10%) ラウエンシュタイン軟膏
	坐剤 2		ウリナスタチン腔坐薬1万単位 チラーヂンS坐薬 100 µg	
	液剤 21	塩化アルミニウム水溶液20% SADBEアセトン溶液 (各種濃度) トルイジンブルー液2% ピオクタニン液0.03% ピオクタニン液1%1mL (アンプル) ブロー氏液 メチレンブルー液2%	液状フェノール 鼓膜麻酔液 酢酸3% 硝酸銀液 (各種濃度) ピオクタニン液1% 1mL (マーキング用) マーキング用墨 ミノール液※1 ヨウ素ヨウ化カリウム液3%	A:ネブライザー液(処置用) エピネフリン液0.02% グリセリン液25% ^{※2} チオ硫酸ナトリウム液2% ^{※2} ポビドンヨード点耳液5% 水酸化カリウム液20% ^{※2}
	点眼剤 2			PAヨード点眼・洗眼希釈液 ^{※2} エピネフリン点眼液0.02%
注射剤 5	用時溶解 1	注射用亜硝酸ナトリウム300mg		
	注射剤 4	安息香酸ナトリウム注射液20% パテントブルー注射液2% メチレンブルー注射液1%		20万倍 (0.0005%) エピネフリン注射液

クラス I および II : 許可を得た診療科のみ使用可能(使用制限あり)・同意取得**必要**
 ただし手術野等のマーキングに使用する院内製剤は全診療科使用可能・同意取得**不要**
 クラス III : 全診療科使用可能・同意取得**不要**
 ※1 全診療科使用可能・同意取得**必要**
 ※2 使用制限あり

院内製剤処方一覧

2025年 3月 29日現在

1. 内用剤

1. 散剤

1) ピルビン酸ナトリウム散(クラス I)

ピルビン酸ナトリウム

[適 応] ミトコンドリア病

[貯 法] 室温保存

[使用制限] 小児科

[在 庫] 用時調製

2) ビオチン原末(クラス I)

ビオチン原末

[適 応] 複合カルボキシラーゼ欠損症

[貯 法] 室温保存

[使用制限] 小児科

[在 庫] 用時調製

2. 外用剤

1. 軟膏剤

1) Mohs' paste(クラス I)

塩化亜鉛	25.0 g	[適 応]	出血・疼痛・細菌感染の防止,
注射用水	12.5 mL		悪臭の抑制および腫瘍の縮小
亜鉛華デンプン	12.5 g	[貯 法]	室温保存
グリセリン	適量	[使用制限]	皮膚科
全量	62.26 g	[在 庫]	用時調製

2) カプサイシン軟膏(0.025%, 0.05%)(クラス I)

	(0.025%)	(0.05%)	
カプサイシン	0.025 g	0.05 g	[適 応]1) 帯状疱疹後神経痛の疼痛緩和
プロピレングリコール	0.2 mL	0.4 mL	2) 慢性炎症脱髄性多発神経炎
親水クリーム	適量	適量	[貯 法] 冷所保存
全量	100.0 g	100.0 g	[使用制限]1)2) 麻酔科, 1)皮膚科(0.025%のみ)
			[在 庫] あり

3) ヒドロキノン軟膏 10%(クラス I)

ヒドロキノン	10.0 g	[適 応]	色素沈着症
デキサメタゾン	0.04 g	[貯 法]	冷暗所保存
アスコルビン酸	0.3 g	[使用制限]	皮膚科, 形成外科
親水クリーム	適量	[在 庫]	あり
全量	100.0 g		

4) ポビドンヨード・ソルトゲル(10%)(クラス III)

	(10%)	[適 応]	CAPD 患者における出口部感染の予防と治療
塩化ナトリウム	5.0 g	[貯 法]	室温保存
ポビドンヨードゲル	45.0 g	[使用制限]	全診療科使用可
全量	50.0 g	[在 庫]	用時調製

5) メトロナダゾールクリーム 1%(クラス I)

メトロナダゾール	1.0 g	[適 応]	酒さ, 酒さ様皮膚炎
プロピレングリコール	1.0 mL	[貯 法]	冷暗所保存
親水クリーム	適量	[使用制限]	皮膚科
全量	100.0 g	[在 庫]	あり

6) ラウエンシュタイン軟膏(クラスⅢ)

次没食子酸ビスマス	10.0 g	[適 応]	人工肛門, 腸瘻周辺の皮膚炎
精製ラノリン	150.0 g	[貯 法]	室温保存
酸化亜鉛	125.0 g	[使用制限]	全診療科使用可
トウモロコシデンプン	125.0 g	[在 庫]	あり
オリーブ油	90.0 g		
全量	500.0 g		

2. 坐剤

1) ウリナスタチン腔坐剤 10,000 単位(クラスⅡ)

ウリナスタチン(ミラクリッド注射液)	10,000 単位	[適 応]	切迫早産治療, 破水防止
ハードファット S-55	適量	[貯 法]	冷所保存
全量	1.4 mL	[使用制限]	産婦人科
		[在 庫]	あり
		[備 考]	1.4 mL/本

2) チラーヂンS坐剤 100 µg(クラスⅡ)

チラーヂンS錠(50µg)	30 錠	[適 応]	甲状腺機能低下症
ハードファット S-55	適量	[貯 法]	冷暗所保存
全量	15.8 g	[使用制限]	内分泌・糖尿病内科, 小児科
(15 個分)		[在 庫]	なし

3. 外用液剤

1) A: ネブライザー液(クラスⅢ)

サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1%	60 mL	[適 応]	咽頭炎, 副鼻腔炎
プリピナ液(点鼻用)	100 mL	[貯 法]	冷暗所保存
注射用水	適量	[使用制限]	外来処置用
全量	400 mL	[在 庫]	用時調製

2) SADBE アセトン溶液 各種濃度(クラスⅠ)

(1%)		[適 応]	円形脱毛症・尋常性白斑 ウイルス性疣贅(尋常性疣贅, 青年性扁平疣贅など)
スクワレン酸ジブチルエステル	0.2 mL		
アセトン	適量		
全量	20 mL		免疫能検査
		[貯 法]	冷暗所保存
		[使用制限]	皮膚科
		[在 庫]	用時調製
		[備 考]	使用期限: 3 か月

3) 液状フェノール(クラスⅡ)

液状フェノール	必要量	[適 応] 巻入り爪の治療
		[貯 法] 室温保存
		[使用制限] 皮膚科, 形成外科
		[在 庫] あり

4) エピネフリン液 0.02%(クラスⅢ)

0.1%ボスミン液	20 mL	[適 応] 粘膜等の止血
生理食塩液	適量	[貯 法] 冷暗所保存
全量	100 mL	[使用制限] 全診療科使用可
		[在 庫] 用時調製

5) 塩化アルミニウム水溶液 20%(クラスⅠ)

塩化アルミニウム・6水和物	20 g	[適 応] 多汗症
注射用水	適量	[貯 法] 室温保存
全量	100 mL	[使用制限] 皮膚科, 麻酔科
		[在 庫] 用時調製

6) グリセリン液 25%(クラスⅢ)

グリセリン	81.6 mL	[適 応] 低出生体重児および新生児の排便促進
注射用水	300 g	[貯 法] 室温保存
全量	400 g	[使用制限] 新生児科
		[在 庫] 用時調製

7) 鼓膜麻酔液(クラスⅡ)

眼科用キシロカイン液 4%	10 mL	[適 応] 鼓膜切開・穿刺時の局所麻酔
液状フェノール	5 mL	[貯 法] 冷暗所保存
無水エタノール	適量	[使用制限] 耳鼻咽喉科
全量	40 mL	[在 庫] なし
		[備 考] 2 mL/アンプル

8) 酢酸 3%(クラスⅡ)

氷酢酸	15 mL	[適 応] 膣鏡検査
注射用水	適量	[貯 法] 室温保存
全量	500 mL	[使用制限] 産婦人科
		[在 庫] あり
		[備 考] 500 mL/本

9) 硝酸銀液 各種濃度(クラスⅡ)

(1%)	
硝酸銀	1.0 g
注射用水	適量
全量	100 mL

- [適 応] 1) 咽頭および耳のポリープ等の焼灼,
鼻出血の止血(2, 5, 10%)
2) 臍肉芽腫症を合併した新生児の肉芽焼灼(15%)
3) 腹膜透析用カテーテルの出口部に生じた
不良肉芽の焼灼(15%)

[貯 法] 暗所保存

[使用制限] 1) 耳鼻咽喉科

2) 小児科

3) 人工腎臓部

[在 庫] 用時調製

10) 水酸化カリウム液 20%(クラスⅢ)

水酸化カリウム	20 g
注射用水	適量
全量	100 mL

[適 応] 糸状菌等の鏡検

[貯 法] 室温保存

[使用制限] 皮膚科

[在 庫] 用時調製

11) チオ硫酸ナトリウム液 2%(クラスⅢ)

チオ硫酸ナトリウム・6水和物	564.84 g
精製水	適量
全量	18000 mL

[適 応] ヨードの脱色

[貯 法] 室温保存

[使用制限] 中央材料部

[在 庫] 用時調製

12) トルイジンブルー液 2%(クラスⅠ)

トルイジンブルー	2.0 g
注射用水	適量
全量	100 mL

[適 応] 食道内視鏡検査(早期食道癌の診断)

[貯 法] 室温保存

[使用制限] 消化器・肝臓内科, 消化管・一般外科

[在 庫] 用時調製

13) ピオクタニン液 0.03%(クラスⅠ)

ゲンチアナバイオレット	0.03 g
注射用水	適量
全量	100 mL

[適 応] 胃・大腸内視鏡検査(ピットパターン[○]の判定)

[貯 法] 暗所保存

[使用制限] 消化器・肝臓内科, 消化管・一般外科

[在 庫] 用時調製

14) ピオクタニン液 1% 1mL(アンプル)(クラス I)

ゲンチアナバイオレット	1.0 g	[適 応]	創部 MRSA 定着・感染が認められる褥瘡, 難治性潰瘍の抗菌効果
注射用水	適量	[貯 法]	暗所保存
全量	100 mL	[使用制限]	形成・美容外科
		[在 庫]	あり

15) ピオクタニン液 1% 1mL(マーキング用)(クラス II)

ゲンチアナバイオレット	1.0 g	[適 応]	手術野のマーキング
注射用水	適量	[貯 法]	暗所保存
全量	100 mL	[使用制限]	全診療科使用可
		[在 庫]	あり

16) ブロー氏液(クラス I)

酢酸アルミニウム	0.52 g	[適 応]	難治性の慢性中耳炎, 肉芽形成を伴う中耳炎
酢酸	1.25 mL	[貯 法]	冷所保存
酒石酸	0.225 g	[使用制限]	耳鼻咽喉科
注射用水	適量	[在 庫]	あり
全量	5 mL		

17) ポピドンヨード点耳液 5%(クラス III)

ポピドンヨード液	2.5 mL	[適 応]	慢性中耳炎, 外耳炎, 外耳道真菌症等, 中・外耳の慢性炎症性疾患患者に対する消毒
注射用水	適量	[貯 法]	室温保存
全量	5.0 mL	[使用制限]	全診療科使用可
		[在 庫]	あり
		[備 考]	5 mL/本

18) マーキング用墨(クラス II)

墨を濃いめに磨った液	0.5 mL	[適 応]	胃・大腸癌などの消化管腫瘍のマーキング 口腔癌辺縁のマーキング
		[貯 法]	室温保存
		[使用制限]	全診療科使用可
		[在 庫]	あり

[備考] 0.5 mL/アンプル

19) ミノール液(クラスⅡ)

ヨード	15.0 g	[適 応]	発汗異常症の検査
ヒマシ油	100 mL	[貯 法]	冷所保存
無水エタノール	適量	[使用制限]	全診療科
全量	1000 mL	[在 庫]	用時調製

20) メチレンブルー液 2%(クラスⅠ)

メチレンブルー3水和物	2.34 g	[適 応]	内視鏡下における消化管染色
注射用水	適量	[貯 法]	暗所保存
全量	100 mL	[使用制限]	消化管・一般外科
		[在 庫]	用時調製

21) ヨウ素ヨウ化カリウム液 3%(クラスⅡ)

ヨウ素	3.0 g	[適 応]	1) 食道内視鏡検査(早期食道癌の診断)
ヨウ化カリウム	6.0 g		2) 頭頸部腫瘍検査
注射用水	適量	[貯 法]	暗所保存
全量	100 mL	[使用制限]	1) 消化器・肝臓内科, 消化管・一般外科
			2) 耳鼻咽喉科
		[在 庫]	用時調製

4. 点眼液

1) PAヨード点眼・洗眼希釈液(クラスⅢ)

PAヨード点眼・洗眼液	10 mL	[適 応]	手術時における点眼・洗眼殺菌
生理食塩液	50 mL	[貯 法]	冷暗所保存
全量	60 mL	[使用制限]	眼科
		[在 庫]	用時調製
		[備 考]	穿刺後 24 時間まで使用可

2) エピネフリン点眼液 0.02%(クラスⅢ)

ボスミン液 0.1%	20 mL	[適 応]	眼科領域の止血
生理食塩液	適量	[貯 法]	冷暗所保存
全量	100 mL	[使用制限]	全診療科使用可
		[在 庫]	あり
		[備 考]	2.5mL/本

3. 注射剤

1. 用時溶解

1) 注射用亜硝酸ナトリウム(クラス I)

亜硝酸ナトリウム	300 mg	[適 応]	シアン化水素および硫化水素中毒の解毒
		[貯 法]	暗所保存
		[使用制限]	救命救急科
		[在 庫]	あり
		[備 考]	300 mg/バイアル

2. 注射剤

1) 20 万倍(0.0005%)エピネフリン注射液(クラス III)

ボスミン注	1.0 mL	[適 応]	手術中患者の術野での止血
生理食塩水 PL	適量	[貯 法]	暗所保存
全量	200 mL	[使用制限]	全診療科使用可
		[在 庫]	用時調製

2) 安息香酸ナトリウム注射液 20%(クラス I)

安息香酸ナトリウム	2.0 g	[適 応]	高アンモニア血症の治療
注射用水	適量	[貯 法]	暗所保存
全量	10 mL	[使用制限]	小児科
		[在 庫]	あり
		[備 考]	10 mL/アンプル

3) パテントブルー注射液 2%(クラス I)

パテントブルー	2.0 g	[適 応]	1) 皮膚癌におけるセンチネルリンパ節生検 2) リンパ管吻合手術におけるリンパ管の同定
注射用水	適量	[貯 法]	暗所保存
全量	100 mL	[使用制限]	1) 皮膚科 2) 形成外科
		[在 庫]	あり
		[備 考]	3 mL/アンプル

4) メチレンブルー注射液 1%(クラス I)

メチレンブルー	1.0 g	[適 応]	各種薬・毒物によるメヘモグロビン血症の治療
注射用水	適量	[貯 法]	暗所保存
全量	100 mL	[使用制限]	救命救急科
		[在 庫]	あり
		[備 考]	20 mL/アンプル